


Afati kohor i vaksinimit të fëmijërisë

NHS

Staffordshire and
Stoke-on-Trent
Integrated Care Board

 Informacioni rreth vaksinimeve mund të gjendet gjithashtu në të dhënat shëndetësore të fëmijës tuaj në 'Librin e kuq'. Ju do të kontaktoheni nga mjeku juaj i përgjithshëm kur të jetë koha për të mbrojtur fëmijën tuaj.



Mosha 8 javë

6-në-1 (doza e 1-rë)

Mbron kundër difterisë, tetanozit, kollës së mirë, poliomyelilitit, hemofilus influenzae tip B dhe hepatitit B. Gjendet bakteriale dhe virale nga të cilat foshnjat dhe fëmijët e vegjël janë veçanërisht të prekshëm.

MenB (doza e 1-rë)

Forma më e zakonshme e meningjitit që mund të çojë në dëmtime të rënda të trurit.

Rotavirusi (doza e 1-rë)

Një virus i stomakut shumë infektiv.



Mosha 12 javë

6-në-1 (doza e 2-të)

Vaksina pneumokokale

Mbron nga një sërë infeksionesh bakteriale nga pneumonia deri te infeksioni i veshit.

Rotavirusi (doza e 2-të)



Mosha 16 javë

6-në-1 (doza e 3-të)

Një dozë e vetme vaksine siguron vetëm mbrojtje të pjesshme. Fëmija juaj ka nevojë për të gjitha dozat për të marrë mbrojtje të plotë.

MenB (doza e 2-të)



Mosha 1 vit

Hib/MenC

Mbron kundër infeksioneve dhe rrit mbrojtjen e fituar tashmë nga 6-në-1.

MMR (doza e 1-rë)

Fruthi, shytat dhe rubeola. Të gjitha janë shumë infektive me potencial për dëmtime afatgjatë.

Vaksina pneumokokale (doza e 2-të)

Vaksina MenB (doza e 3-të)



Mosha 2 vjet

Gripi (vjetor)

Sprej hundor. Fëmijët mund të jenë "super përhapës".

Një super përhapës është dikush që transmeton një sëmundje infektive te një numër jashtëzakonisht i madh personash të tjerë.



Mosha 3 vjet e 4 muaj

MMR (doza e 2-të)

Përforcues parashkollor 4 në 1

Rrit mbrojtjen ekzistuese kundër difterisë, tetanozit, kollës së mirë dhe poliomyelilitit.