

الجدول الزمني لتطعيمات مرحلة الطفولة

يمكن العثور أيضًا على معلومات حول التطعيمات في سجل "الكتاب الأحمر" لصحة طفلك. سيتم التواصل معك من قبل عيادة الطبيب العام عندما يحين الوقت لتطعيم طفلك.



NHS

Staffordshire and
Stoke-on-Trent
Integrated Care Board



عمر 3 سنوات و4 أشهر

الثلاثي الفيروسي (الجرعة الثانية) 2

لقاح المعزز 4 في 1

يزيد من الحماية القائمة ضد الخناق (الديفتيريا) والكزاز والسعال الديكي وشلل الأطفال.



عمر عامين

رذاذ الأنف للإنفلونزا (الموسمية)

يمكن للأطفال أن يكونوا "ناقلين فائقين".

الناقل الفائق هو شخص ينقل مرض معدي إلى عدد كبير غير عادي من الأشخاص الآخرين.



عمر عام واحد

المستدمية النزلية/التهاب السحايا.

يحمي ضد الالتهابات ويعزز الحماية المكتسبة مسبقاً من جرعة مطعوم الـ 6 في 1.

الثلاثي الفيروسي (الجرعة الأولى)

الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية. جميعها شديدة الالتهابات مع احتمال حدوث أضرار طويلة المدى.

لقاح المكورات الرئوية (الجرعة الثانية)

التهاب السحايا من النوع (ب) (الجرعة الثالثة)



عمر 16 أسبوعاً

6 في 1 (الجرعة الثالثة)

توفر الجرعة الواحدة من التطعيم حماية جزئية فقط. يحتاج طفلك إلى جميع الجرعات للحصول على حماية كاملة.

التهاب السحايا من النوع (ب) (الجرعة الثانية)



عمر 12 أسبوعاً

6 في 1 (الجرعة الثانية)

لقاح المكورات الرئوية

يحمي من مجموعة من الالتهابات البكتيرية من الالتهاب الرئوي إلى التهاب الأذن.

فيروس الروتا (الجرعة الثانية)



عمر 8 أسابيع

6 في 1 (الجرعة الأولى)

تحمي ضد الخناق (الديفتيريا) والكزاز والسعال الديكي وشلل الأطفال والمستدمية النزلية من النوع (ب) والتهاب الكبد الوبائي (ب) وحالات بكتيرية وفيرسية يكون الرضع والأطفال الصغار عرضة لها بشكل خاص.

التهاب السحايا من النوع (ب) (الجرعة الأولى)

أكثر أشكال التهاب السحايا شيوعاً التي قد تؤدي إلى إصابة شديدة في الدماغ

فيروس الروتا (الجرعة الأولى)

جرثومة معدية شديدة العدوى.