

# جدول زمانی واکسیناسیون دوران کودکی

NHS

Staffordshire and  
Stoke-on-Trent  
Integrated Care Board

اطلاعات مربوط به واکسیناسیون را میتوان در پرونده سلامت فرزندتان در «کتاب قرمز» نیز یافت. هنگامی که زمان محافظت از فرزندتان فرا رسید، از طریق مطب پزشک عمومی با شما تماس گرفته خواهد شد.



## سن ۳ سال و ۴ ماه

MMR (دوز ۲)

### دوز یادآور پیش دبستانی چهارگانه

محافظت موجود در برابر  
دیفتری، کزاز، سیاه سرفه و  
فلج اطفال را افزایش میدهد.



## سن ۲ سالگی

آنفلوآنزا (سالانه)

اسپری بینی. بچه ها میتوانند  
«ابر پخش کننده» باشند.

ابر پخش کننده کسی است  
که یک بیماری عفونی را به  
افراد زیادی منتقل میکند.



## سن ۱ سالگی

Hib/MenC

در برابر عفونتها محافظت  
میکند و محافظتی که قبلاً از  
واکسن شش گانه به دست  
آمده بود را افزایش میدهد.

MMR (دوز ۱)

سرخک، اوریون و سرخجه.  
همه بسیار عفونی با احتمال  
آسیب طولانی مدت.

واکسن پنوموکوک (دوز ۲)

واکسن MenB

(دوز ۳)



## سن ۱۶ هفتگی

واکسن شش گانه (دوز ۳)

یک دوز واحد از واکسن فقط  
محافظت نسبی ایجاد میکند.  
کودک شما برای دریافت  
محافظت کامل به تمام دوزها  
نیاز دارد.

MenB (دوز ۲)



## سن ۱۲ هفتگی

واکسن شش گانه (دوز ۲)

واکسن پنوموکوک

از طیف وسیعی از عفونتهای  
باکتریایی از ذات الریه گرفته  
تا عفونت گوش محافظت  
میکند.

روتاویروس (دوز ۲)



## سن ۸ هفتگی

واکسن شش گانه (دوز ۱)

در برابر دیفتری، کزاز،  
سیاه سرفه، فلج اطفال،  
هموفیلوس آنفلوآنزا نوع  
بی و هپاتیت بی محافظت  
میکند. بیماریهای باکتریایی و  
ویروسی که نوزادان و کودکان  
خردسال به ویژه در برابر آن  
آسیب پذیر هستند.

MenB (دوز ۱)

شایعترین شکل مننژیت که  
میتواند منجر به آسیب  
مغزی شدید شود.

روتاویروس (دوز ۱)

یک عامل بسیار عفونی در  
معدده.