


Gyermekkori védőoltások idővonala

NHS

Staffordshire and
Stoke-on-Trent
Integrated Care Board

 A védőoltásokról a gyermeke piros **egészségügyi kiskönyvében** is olvashat. A háziorvosi rendelő felveszi Önnel a kapcsolatot, amikor eljön a gyermeke védőoltásának ideje.



8 hetes kor

6 az 1-ben (1. dózis)

Az oltás a diftéria, tetanusz, szamárköhögés, gyermekbénulás, Haemophilus influenzae B, és hepatitis B ellen nyújt védelmet. Ezek bakteriális és vírusos betegségek, amelyekkel szemben a csecsemők és kisgyermekek különösen érzékenyek.

MenB (1. dózis)

Az agyhártyagyulladás leggyakoribb formája, amely súlyos agykárosodáshoz vezethet.

Rotavírus (1. dózis)

Rendkívül fertőző gyomorbetegség.



12 hetes kor

6 az 1-ben (2. dózis)

Pneumococcus elleni védőoltás

Bakteriális fertőzések széles köre ellen nyújt védelmet a tüdőgyulladástól kezdve a fülgyulladásig.

Rotavírus (2. dózis)



16 hetes kor

6 az 1-ben (3. dózis)

Az oltás egyetlen dózisa csak részleges védeltséget nyújt. Gyermekeinek az összes dózisa szüksége van a teljes védeltséghez.

MenB (2. dózis)



1 éves kor

Hib/MenC

Véd a fertőzések ellen, és erősíti a 6 az 1-ben oltással már megszerzett védelmet.

MMR (1. dózis)

Kanyaró, mumpsz és rubeola. Mindegyik különösen fertőző, és hosszú távú károsodást okozhat.

Pneumococcus elleni védőoltás (2. dózis)

MenB védőoltás (3. dózis)



2 éves kor

Influenza (évente)

Orrspray. A gyermekek szuperterjesztők lehetnek.

A szuperterjesztő olyan személy, aki egy fertőző betegséget szokatlanul sok embernek ad át.



3 éves és 4 hónapos kor

MMR (2. dózis)

4 az 1-ben óvodáskori emlékeztető oltás

A diftéria, tetanusz, szamárköhögés és gyermekbénulás elleni meglévő védeltséget erősíti.