


# Bērnu vakcinācijas grafiks

**NHS**

Staffordshire and  
Stoke-on-Trent  
Integrated Care Board

 Informāciju par vakcināciju var atrast arī jūsu bērna “Sarkanās grāmatīņas” ierakstā par veselību. Kad pienāks laiks nodrošināt jūsu bērna aizsardzību, ar jums sazināsies ģimenes ārsts.



## 8 nedēļu vecumā

### Kombinētā vakcīna (1. deva)

Aizsargā pret difteriju, stingumkrampjiem, garo klepu, poliomielītu, b tipa Haemophilus influenzae infekciju un B hepatītu. Tās ir bakteriālas un vīrusu izraisītas slimības, pret kurām mazi bērni ir īpaši uzņēmīgi.

### Meningokoka B tipa infekcija (1. deva)

Visizplatītākā meningīta forma, kas var izraisīt smagus smadzeņu bojājumus.

### Rota vīruss (1. deva)

Ļoti infekcioza kuņģa slimība.



## 12 nedēļu vecumā

### Kombinētā vakcīna (2. deva)

### Pneimokoku vakcīna

Aizsargā pret virkni bakteriālu infekciju — no pneimonijas līdz ausu infekcijai.

### Rota vīruss (2. deva)



## 16 nedēļu vecumā

### Kombinētā vakcīna (3. deva)

Viena vakcīnas deva nodrošina tikai daļēju aizsardzību. Jūsu bērnam pilnai aizsardzībai jāsaņem visas devas.

### Meningokoka B tipa infekcija (2. deva)



## 1 gada vecumā

### b tipa Haemophilus influenzae infekcijas / meningokoka C tipa infekcijas vakcīna

Aizsargā pret infekcijām un veicina aizsardzību, kas jau iegūta no kombinētās vakcīnas.

### MMR (1. deva)

Masalas, epidēmiskais parotīts un masaliņas. Visas īpaši infekciozas slimības ar ilglaicīga kaitējuma potenciālu.

### Pneimokoka vakcīna (2. deva)

### Meningokoka B tipa infekcijas vakcīna (3. deva)



## 2 gadu vecumā

### Gripas vakcīna (katru gadu)

Deguna aerosols. Bērni var būt lielākie gripas izplatītāji.

Lielākie gripas izplatītāji ir tie, kuri pārnes infekcijas slimību uz neparasti lielu citu cilvēku skaitu.



## 3 gadu un 4 mēnešu vecumā

### MMR vakcīna (2. deva)

### Atkārtotā vakcīna pirmsskolas vecuma bērniem (“četri vienā”)

Uzlabo esošo aizsardzību pret difteriju, stingumkrampjiem, garo klepu un poliomielītu.