

Kiedy szczepić dzieci

 Informacje na temat szczepień można również znaleźć w karcie zdrowia dziecka, tzw. „**czerwonej książeczce**”. Twój lekarz rodzinny skontaktuje się z Tobą, gdy nadejdzie czas, aby zaszczepić dziecko.

NHS

Staffordshire and
Stoke-on-Trent
Integrated Care Board



Wiek: 8. tydzień

6-w-1 (dawka 1)

Chroni przed błonimą, tężcem, krztuścem, polio, Haemophilus influenzae typu B i wirusowym zapaleniem wątroby typu B. To choroby bakteryjne i wirusowe, na które niemowlęta i małe dzieci są szczególnie narażone.

MenB (dawka 1)

Najczęstsza postać zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, która może prowadzić do poważnego uszkodzenia mózgu.

Rotawirus (dawka 1)

Wysocze zakaźny wirus żołądkowo-jelitowy.



Wiek: 12. tydzień

6-w-1 (dawka 2)

Szczepionka przeciwko pneumokokom

Chroni przed szeregiem infekcji bakteryjnych, od zapalenia płuc po zapalenie ucha.

Rotawirus (dawka 2)



Wiek: 16. tydzień

6-w-1 (dawka 3)

Jedna dawka szczepionki zapewnia jedynie częściową ochronę. Twoje dziecko potrzebuje wszystkich dawek, aby uzyskać pełną ochronę.

MenB (dawka 2)



Wiek: 1. rok

Hib/MenC

Chroni przed infekcjami i poprawia ochronę uzyskaną dzięki szczepionce 6 w 1.

MMR (dawka 1)

Odra, świnka i różyczka. Wszystkie te choroby są wysoce zakaźne i mogą powodować długotrwały ubytek na zdrowiu.

Szczepionka przeciwko pneumokokom (dawka 2)

Szczepionka MenB (dawka 3)



Wiek: 2 lata

Grypa (corocznie)

Spray do nosa. Dzieci są często „supersprederami”, czyli osobami, które przenoszą chorobę zakaźną na niezwykle dużą liczbę innych osób.



Wiek: 3 lata i 4 miesiące

MMR (dose 2)

Dawka przypominająca 4 w 1 dla przedszkolaków

Zwiększa istniejącą ochronę przed błonimą, tężcem, krztuścem i polio.