


# Calendarul de vaccinare a copiilor

**NHS**

Staffordshire and  
Stoke-on-Trent  
Integrated Care Board

 Informațiile despre vaccinări pot fi consultate și în fișa medicală din „carnetul roșu” al copilului. Veți fi contactat(ă) de cabinetul medicului de familie în momentul în care copilul trebuie vaccinat.



## 2 luni

### Vaccinul hexavalent (6 în 1) (prima doză)

Vaccinare antidifterie, antitetanos, antituse convulsivă, antipoliomielită, antihaemophilus influenzae B și antihepatita B. Afecțiuni bacteriene și virale la care sugarii și copiii mici sunt deosebit de vulnerabili.

### Vaccinul meningococic împotriva meningitei de tip B (prima doză)

Forma de meningită cel mai des întâlnită și care poate cauza leziuni cerebrale grave.

### Vaccinul antirotavirus (prima doză)

Un virus extrem de contagios care provoacă o inflamație a stomacului și intestinelor.

## 3 luni

### Vaccinul hexavalent (6 în 1) (a doua doză)

### Vaccinul antipneumococic

Protejează împotriva mai multor infecții bacteriene, de la pneumonie la infecții ale urechii.

### Antirotavirus (a doua doză)

## 4 luni

### Vaccinul hexavalent (6 în 1) (a treia doză)

O singură doză de vaccin asigură doar o protecție parțială. Copilul are nevoie de toate dozele pentru protecția integrală.

### Vaccinul meningococic împotriva meningitei de tip B (a doua doză)

## 1 an

### Vaccinul antihaemophilus influenzae B/vaccinul meningococic împotriva meningitei de tip B

Protejează împotriva infecțiilor și întărește protecția deja oferită de vaccinul hexavalent (6 în 1).

### ROR (prima doză)

Vaccinare antirujeolă, antirubeolă, antioreion. Toate acestea sunt boli extrem de contagioase, care pot cauza leziuni pe termen lung.

### Vaccinul antipneumococic (a doua doză)

### Vaccinul meningococic împotriva meningitei de tip B (a treia doză)

## 2 ani

### Vaccinul antigripal (anual)

Sub formă de spray nazal. Copiii pot răspândi boala foarte rapid (așa-zisii „supercontagioși”).

O persoană supercontagioasă este cea care transmite o boală infecțioasă unui număr deosebit de mare de persoane.

## 3 ani și 4 luni

### ROR (a doua doză)

### Vaccinul tetravalent (4 în 1) de rapel administrat preșcolărilor

Crește protecția deja dobândită împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive și poliomielitei.