

# بچپن میں ویکسینیشن کی ٹائم لائن

NHS

Staffordshire and  
Stoke-on-Trent  
Integrated Care Board

ویکسینیشن کے بارے میں معلومات آپ کے بچے کے 'ریڈ بک' ہیلتھ ریکارڈ میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ آپ کے بچے کو محفوظ بنانے کا وقت آنے پر آپ کے GP سرجری کی جانب سے آپ سے رابطہ کیا جائے گا۔



## عمر 3 سال اور 4 ماہ

MMR (خوراک نمبر 2)

### 1-4-پری اسکول بوسٹر

خناق، تشنج، کالی کھانسی اور پولیو کے خلاف موجود تحفظ میں اضافہ کرتا ہے۔

## عمر 2 سال

فلو (سالانہ)

ناک کا اسپرے، بچے "سپر اسپریڈرز" یعنی کہ بچے کو پھیلاؤ کا باعث بن سکتے ہیں۔

سپر اسپریڈر ایک ایسا فرد ہوتا ہے جو کسی بھی متعدی مرض کو دیگر افراد کی غیر معمولی تعداد میں منتقل کرتا ہے۔

## عمر 1 سال

Hib/MenC

انفیکشنز سے بچتی ہے اور 1-6-میں-6 کے ذریعے پہلے سے حاصل شدہ تحفظ کو دوچند کرتی ہے۔

MMR (خوراک نمبر 1)

خسرہ، کن پیڑے اور روبیلا۔ یہ تمام انتہائی متعدی نوعیت کے امراض ہیں جن سے تادیر باقی رہنے والا نقصان پہنچ سکتا ہے۔

نیوموکوکل ویکسین (خوراک نمبر 2)

MenB ویکسین

(خوراک نمبر 3)

## عمر 16 ہفتے

1-6-میں-6 (خوراک نمبر 3)

ویکسین کی ایک خوراک محض جزوی تحفظ فراہم کرتی ہے۔ مکمل تحفظ کے لیے آپ کے بچے کو تمام خوراکیں درکار ہوتی ہیں۔

MenB (خوراک نمبر 2)

## عمر 12 ہفتے

1-6-میں-6 (خوراک نمبر 2)

### نیوموکوکل ویکسین

نمونیا سے لے کر کان کے انفیکشن تک، بیکٹیریا سے ہونے والے متعدد طرح کے انفیکشنز سے بچاتی ہے۔

روٹا وائرس (خوراک نمبر 2)

## عمر 8 ہفتے

1-6-میں-6 (خوراک نمبر 1)

خناق، تشنج، کالی کھانسی، پولیو، ہیموپیلس انفلوئنزا ٹائپ B اور ہیپاٹائٹس B کے خلاف تحفظ دیتی ہے۔ یہ بیکٹیریا اور وائرس سے ہونے والے وہ طبی عوارض ہیں جن کی زد میں نومولود اور چھوٹے بچے بالخصوص آ سکتے ہیں۔

MenB (خوراک نمبر 1)

گردن توڑ بخار کی عام ترین شکل جو دماغ کو سنگین نقصان پہنچنے کا باعث ہو سکتی ہے۔

روٹا وائرس (خوراک نمبر 1)

معدے کا انتہائی نوعیت کا متعدی مرض۔